CDDP＋GEM短時間

治療スケジュール：1コース　3週間

薬剤名	投与量	効能	投与経路	投与時間	1日目	…	8日目	…
ソルデム1 ＋硫酸Mg補正液 ＋KCL注	500mL 8mEq 10mEq	電解質補正	点滴	60分	○			
アロキシ注 ＋デキサート注 ＋生理食塩液	0.75mg 9.9mg 100mL	制吐薬	点滴	30分	○			
デキサート注 +グラニセトロン注	3m g 6.6mg	制吐薬	点滴	15～30分			○	
ゲムシタビン注 ＋５%ブドウ糖液	**1000mg/㎡** 250mL	治療薬	点滴	30分	○		○	
生理食塩液	50mL		点滴	15分	○		○	
マンニット-ルS注射液	200mL	利尿剤	点滴	30分	○			
シスプラチン注 ＋生理食塩液	**80mg/㎡** 250mL	治療薬	点滴	60分	○			
ソルデム1 ＋KCL注	500mL 10mEq	電解質補正	点滴	60分	○			

制吐薬のアプレピタント（先発名：イメンド）を1日から3日目まで、デキサメタゾン（先発名：デカドロン）を2日から4日目まで内服

大森赤十字病院　薬剤部