

CDDP+PEM+ペムブロリズマブ(術前)

治療スケジュール：1コース 3週間

薬剤名	投与量	効能	投与経路	投与時間	1日目	...
生理食塩液	50mL		点滴	5分	○	
キイトルーダ注 +生理食塩液	200mg 100mL	治療薬	点滴	30分	○	
生理食塩液	50mL		点滴	5分	○	
パロノセトロン注 +デキサート注 +アロカリス注	0.75mg 9.9mg 235mg	制吐薬	点滴	30分	○	
ペメトレキセド注 +生理食塩液	500mg/m² 100mL	治療薬	点滴	10分	○	
生理食塩液	50mL		点滴	全開	○	
ソルデム3A +硫酸Mg補正液	500mL 4mEq	腎障害予防	点滴	60分	○	
マンニトールS注	200mL	利尿薬	点滴	30分	○	
シスプラチン注 +生理食塩液	75mg/m² 250mL	治療薬	点滴	60分	○	
ソルデム3A +硫酸Mg補正液	500mL 4mEq	腎障害予防	点滴	60分	○	

・最大4コース施行します。

・初回1週間前から中止後22日目まで副作用軽減のため葉酸（0.5mg/日）を連日内服、9週間毎にビタミンB12（1mg/回）の筋肉内注射を併用します。

大森赤十字病院 薬剤部