CDDP＋PEM短時間

治療スケジュール：1コース　3-4週

薬剤名	投与量	効能	投与経路	投与時間	1日目	…
ソルデム1 ＋硫酸Mg補正液 ＋KCL注	500mL 8mEq 10mEq	電解質補正 腎障害予防	点滴	60分	○	
パロノセトロン注 ＋デキサート注	0.75mg 9.9mg	制吐薬	点滴	30分	○	
ペメトレキセド注 ＋生理食塩液	**500mg/㎡** 100mL	治療薬	点滴	10分	○	
マンニット-ルS注射液	200mL	利尿剤	点滴	30分	○	
シスプラチン注 ＋生理食塩液	**75mg/㎡** 250mL	治療薬	点滴	60分	○	
ソルデム1 ＋KCL注	500mL 10mEq	電解質補正	点滴	60分	○	

※制吐薬のアプレピタント（先発名：イメンドカプセル）を1日目から3日目に内服
※制吐薬のデキサメタゾン（先発名：デカドロン8mg）を2日目から4日目に内服
※初回1週間前から中止後22日目まで副作用軽減のため葉酸（0.5mg/日）を連日内服、9週間毎にビタミンB12（1mg/回）の筋肉内注射を併用します。

大森赤十字病院　薬剤部