

D-MPB(皮下注)初回

治療スケジュール：1コース 6週間

| 薬剤名 | 投与量 | 効能 | 投与経路 | 投与時間 | 1日目 | … | 4日目 | … | 8日目 | … | 11日目 | … | 15日目 | … | 22日目 | … | 25日目 | … | 29日目 | … | 32日目 | … | 36日目 | … | |
|------------------|-------------------------------------|-----|------|------|-----|---|-----|---|-----|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|--|
| ダラキューロ配合 皮下注 | 1800mg | 治療薬 | 皮下注 | 3~5分 | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | |
| ベルケイド注 +生理食塩液 | 1.3mg/m² 1.2mL | 治療薬 | 皮下注 | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | | |

※治療薬のメルファラン（先発名：アルケラン 9mg/m²）とプレドニゾロン（先発名：プレドニン 60mg/m²）を1~4日目に内服します。

※ダラキューロ皮下注投与1~3時間前にデキサメタゾン（先発名：レナデックス）、抗ヒスタミン薬、アセトアミノフェン600mgを服用。但し、1日目は上記記載のプレドニゾロンで代替（抗ロイコトリエン薬、吸入ステロイドを使用する場合あり）