

## DCd(皮下注)1コース

治療スケジュール：1コース 4週間

薬剤名	投与量	効能	投与経路	投与時間	1日目	2日目	…	8日目	9日目	…	15日目	16日目	…	22日目	…
ダラキュー口配合皮下注	1800mg	治療薬	皮下注	3~5分	○			○			○			○	
生理食塩液	50mL		点滴	全開	○	○		○	○		○	○			
カイプロリス点滴静注用 +5%ブドウ糖	20mg/m <sup>2</sup> 50mL	治療薬	点滴	30分	○	○									
カイプロリス点滴静注用 +5%ブドウ糖	56mg/m <sup>2</sup> 50mL	治療薬	点滴	30分				○	○		○	○			
生理食塩液	50mL		点滴	全開	○	○		○	○		○	○			

※1,2,8,9,15,16日目にデキサメタゾン (先発名：レナデックス20mg),22日目にデキサメタゾン (先発名：レナデックス40mg)を併用 (75歳未満)

※1,8,15,22日目にデキサメタゾン (先発名：レナデックス20mg),9,16日目にデキサメタゾン(先発名：レナデックス8mg)を併用 (75歳以上)

※ダラキュー口皮下注投与1~3時間前にデキサメタゾン、抗ヒスタミン薬、アセトアミノフェン1000mgを服用

(抗ロイコトリエン薬、吸入ステロイドを使用する場合あり)

大森赤十字病院 薬剤部