FOLFIRI+ラムシルマブ

治療スケジュール：1コース　2週間

薬剤名	投与量	効能	投与経路	投与時間	1日目	…
生理食塩液	50mL		点滴	30分	○	
サイラムザ注 ＋生理食塩液	**8mg/kg** 250mL	治療薬	点滴	60分	○	
生理食塩液	50mL		点滴	60分 3回目以降15分	○	
パロノセトロン注 +デキサート注	0.75mg 6.6mg	制吐薬	点滴	15～30分	○	
レボホリナート注 ＋生理食塩液	**200mg/㎡** 250mL	フルオロウラシルの効果を高める	点滴	120分 (イリノテカンと同時投与)	○	
イリノテカン注 ＋5%ブドウ糖液	**150mg/㎡** 250mL	治療薬	点滴	90分	○	
フルオロウラシル注 ＋5%ブドウ糖液	**400mg/㎡** 50mL	治療薬	点滴	5分	○	
フルオロウラシル注 ＋5%ブドウ糖液	**2400mg/㎡** 500mL	治療薬	持続点滴	46時間	○	

抗アレルギー薬のジフェンヒドラミン塩酸塩（先発名：レスタミンコーワ　10mg　5錠）を点滴開始前に服用します

大森赤十字病院　薬剤部