

GC

治療スケジュール：1コース 4週間

薬剤名	投与量	効能	投与経路	投与時間	1日目	2日目	3日目	…	8日目	…	15日目	…
5%ブドウ糖液	50mL		点滴	15～30分	○				○		○	
ゲムシタビン注 + 生理食塩液	1000mg/m² 50mL	治療薬	点滴	30分	○				○		○	
生理食塩液	50mL		点滴	5分	○				○		○	
ソルデム1	500mL		点滴	2時間		○						
ソルデム1	200mL		点滴	1時間		○						
フロセミド注 + 生理食塩液	20mg 50mL	利尿薬	点滴	30分		○						
デキサート注 + パロノセトロン注	9.9mg 0.75mg	制吐薬	点滴	30分		○						
シスプラチン注 + 生理食塩液	70mg/m² 500mL	治療薬	点滴	2時間		○						
ソルデム1	500mL		点滴	2時間		○						
ソルデム3A	500mL		点滴	3時間		○						
ソルデム1	500mL		点滴	4時間		○						
ソルデム1	500mL		点滴	5時間			○					
ソルデム1	500mL		点滴	5時間			○					
ソルデム3A	500mL		点滴	5時間			○					
ソルデム3A	500mL		点滴	5時間			○					

制吐薬のアプレピタント(先発名:イメンド)を2日から4日目まで、デキサメタゾン(先発名:デカドロン 8mg)を3日から5日目まで内服 大森赤十字病院 薬剤部