

## イピリマブ+ニボルマブ+CDDP+PEM

治療スケジュール：1コース 6週間

薬剤名	投与量	効能	投与経路	投与時間	1日目	…	22日目	…
生理食塩液	50mL		点滴	5分	○		○	
<b>オプジーブ注</b> +生理食塩液	<b>360mg</b> 64mL	治療薬	点滴	30分	○		○	
生理食塩液	100mL		点滴	30分	○		○	
<b>ヤーボイ注</b> +生理食塩液	<b>1mg/kg</b> 20mL	治療薬	点滴	30分	○			
生理食塩液	50mL		点滴	30分	○			
パロノセトロン注 +デキサート注 +アロカリス注	0.75mg 9.9mg 235mg	制吐薬	点滴	30分	○		○	

次ページへ

生理食塩液	50mL		点滴	15分	○		○	
ペメトレキセド注 +生理食塩液	<b>500mg/m<sup>2</sup></b> 100mL	治療薬	点滴	10分	○		○	
生理食塩液	50mL		点滴	5分	○		○	
ソルデム3A +硫酸Mg補正液	500mL 4mL	腎障害予防	点滴	60分	○		○	
マンニトールS注射液	200mL	利尿薬	点滴	30分	○		○	
シスプラチン注 +生理食塩液	<b>75mg/m<sup>2</sup></b> 500mL	治療薬	点滴	60分	○		○	
ソルデム3A +硫酸Mg補正液	500mL 4mL	腎障害予防	点滴	60分	○		○	

・2コース目からは別レジメンへ移行

・初回1週間前から中止後22日目まで副作用軽減のため葉酸（0.5mg/日）を連日内服、その他、ビタミンB12（1mg/回）の筋肉内注射を併用します。

大森赤十字病院 薬剤部