

## オシメルチニブ+CDDP+PEM短時間

治療スケジュール：1コース 3週間

薬剤名	投与量	効能	投与経路	投与時間	1日目	…
ソルデム1 +硫酸Mg補正液 +KCL注	500mL 8mEq 10mEq	電解質補正 腎障害予防	点滴	60分	○	
パロノセトロン注 +デキサート注	0.75mg 9.9mg	制吐薬	点滴	30分	○	
ペメトレキセド注 +生理食塩液	500mg/m <sup>2</sup> 100mL	治療薬	点滴	10分	○	
マンニットールS注射液	200mL	利尿剤	点滴	30分	○	
シスプラチニン注 +生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 250mL	治療薬	点滴	60分	○	
ソルデム1 +KCL注	500mL 10mEq	電解質補正	点滴	60分	○	

※治療薬のオシメルチニブ（先発名：タグリッソ 80mg/日）を連日内服

※制吐薬のアプレピタント（先発名：イメントカプセル）を1日目から3日目に内服

※制吐薬のデキサメタゾン（先発名：デカドロン8mg）を2日目から4日目に内服

※最大4コース

※初回1週間前から中止後22日目まで副作用軽減のため葉酸（0.5mg/日）を連日内服、9週間毎にビタミンB12（1mg/回）の筋肉内注射を併用します。