

## EC+ペムブロリズマブ（術前5-8コース）

治療スケジュール：1コース 3週

薬剤名	投与量	効能	投与経路	投与時間	1日目	…
生理食塩液	50mL		点滴	5分	○	
<b>キイトルーダ</b> +生理食塩液	<b>200mg/body</b> 100mL	治療薬	点滴	30分	○	
生理食塩液	50mL		点滴	5分	○	
ファモチジン注 +デキサート注 +生理食塩液	20mg 9.9mg 50mL	制吐薬	点滴	15分	○	
パロノセトロン注	0.75mg	制吐薬	点滴	15分	○	
<b>エピルビシン注</b> +生理食塩液	<b>90mg/m<sup>2</sup></b> 50mL	治療薬	点滴	全開で	○	
<b>エンドキサン注</b> +生理食塩液	<b>600mg/m<sup>2</sup></b> 250mL	治療薬	点滴	60分	○	
生理食塩液	50mL		点滴	5分	○	

※術前1-4コースは、PTX+CBDCA+ペムブロリズマブ療法を施行。

※制吐薬のアプレピタント(先発名:イメンド)を1日目～3日目に、デキサメタゾン(先発名:デカドロン4mg)、ファモチジン(先発名:ガスター40mg)を2日目～4日目に内服します。