

## nab-PTX+ペムブロリズマブ (PEM3W)

治療スケジュール：1コース 12週間

| 薬剤名                      | 投与量                                | 効能  | 投与経路 | 投与時間 | 1日目 | ... | 8日目 | ... | 15日目 | ... | 22日目 | ... | 29日目 | ... | 36日目 | ... | 43日目 | ... | 57日目 | ... | 64日目 | ... | 71日目 | ... |
|--------------------------|------------------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 生理食塩液                    | 50mL                               |     | 点滴   | 5分   | ○   | ... |     | ... |      | ... | ○    | ... |      | ... |      | ... | ○    | ... |      | ... | ○    | ... |      | ... |
| <b>キイトルーダ注</b><br>+生理食塩液 | <b>200mg</b><br>100mL              | 治療薬 | 点滴   | 30分  | ○   | ... |     | ... |      | ... | ○    | ... |      | ... |      | ... | ○    | ... |      | ... | ○    | ... |      | ... |
| 生理食塩液                    | 50mL                               |     | 点滴   | 5分   | ○   | ... |     | ... |      | ... | ○    | ... |      | ... |      | ... | ○    | ... |      | ... | ○    | ... |      | ... |
| デキサート注<br>+生理食塩液         | 6.6mg<br>50mL                      | 制吐薬 | 点滴   | 15分  | ○   | ... | ○   | ... | ○    | ... |      | ... | ○    | ... | ○    | ... | ○    | ... | ○    | ... | ○    | ... | ○    | ... |
| <b>アブラキサン注</b><br>+生理食塩液 | <b>100mg/m<sup>2</sup></b><br>50mL | 治療薬 | 点滴   | 30分  | ○   | ... | ○   | ... | ○    | ... |      | ... | ○    | ... | ○    | ... | ○    | ... | ○    | ... | ○    | ... | ○    | ... |
| 生理食塩液                    | 50mL                               |     | 点滴   | 5分   | ○   | ... | ○   | ... | ○    | ... |      | ... | ○    | ... | ○    | ... | ○    | ... | ○    | ... | ○    | ... | ○    | ... |